

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 15.07.2002/4173

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

| Bitki Adı | Zararlı Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre |
|------------|--|----------------|--|
| ELMA | İkinoktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>) | 30 ml/100 L su | 10 gün |
| | Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>) | | |
| | Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>) | | |
| PAMUK | Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus cinnabarinus</i> , <i>Tetranychus urticae</i>) | 135 ml/da | 10 gün |
| YERFISTIĞI | Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>) | 135 ml/da | 10 gün |
| SOYA | Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) | 135 ml/da | 10 gün |
| TURUNÇGİL* | Pasböcüsü (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>) | 60 ml/100 L su | 10 gün |
| | Turunçgil kırmızıörümceği (<i>Panonychus citri</i>) | | |

* Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmaz. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.



ACRİMITE 550 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU 12B AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)

550 g/l Fenbutatin oxide

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HiÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼ 'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ.BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Soluma: Mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi.
Yutma: Mide bulantısı, kusma.
Ciltle Temas: Ciltte tahriş. Kızarıklık.
Gözlerle Temas: Ciddi göz tahrişi.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Genel Bilgiler: Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).
Soluma: Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.
Yutma: Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseyi kesinlikle sıvı bir şey vermayın. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.
Ciltle Temas: Kirli giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.
Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Fenbutatin oxide

ZARARLILIK İŞARETİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H315: Cilt tahrişine yol açar.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H330: Solunması halinde öldürücüdür.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P260: Gaz, duman, buhar veya spreyini solamayın.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koruyucu kıyafet ve eldiven kullanınız.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

UPL AGROMED
Tarım İlaçları ve Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş.
İncirlik Cumhuriyet Mah. İncirlik Bulv. No 316/Z 01
Yüreğir / ADANA Yüreğir V.D. 893 0276 273
Tel 0322 346 46 76 - Faks: 0322 346 47 41
Mersis No: 08930276273000000

MEHMET BAŞER
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ



24 Ocak 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma – Kırmızıörümcek ve Akarlar

Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Pamuk – Kırmızıörümcek

Mücadele zamanının belirlenmesi için, bitkiler 4-6 yapraklıyken sayımlara başlanır. Zararlı yalnız tarla kenarlarında veya içinde lokal olarak bulunuyorsa, sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Yerfıstığı – Kırmızıörümcekler

Yapılacak sayımlarda yaprak başına 8-10 adet kırmızıörümcek tespit edilmişse ilaçlama yapılmalıdır.

Soya – Kırmızıörümcek

Baklalar olgunlaştıktan sonra ilaçlama yapılmamalıdır. Bir yaprakçıkta ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege Bölgesi'nde 10 adet kırmızıörümcek bulunduğu kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçgil – Pasböcüsü

Mayıs ayı başından itibaren 7-8 günde bir bahçenin değişik yerlerinden el lupu ile 100 meyvede yapılan sayımlarda, bir görüş alanında (1-2 cm²) 1-2 adet Pas böcüsü görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.

Turunçgil – Kırmızıörümceği

On yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı bu dönem geçirilmiş ise meyve bağladıktan bir hafta sonra yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: ACRIMITE 550 SC, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 12B olarak sınıflandırılmış bir akaristtir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, ACRIMITE 550 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 12B harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: ACRIMITE 550 SC, yüksek alkali özellikte bitki koruma ürünleri dışında diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılabilir.



ACRIMITE 550 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

| | | |
|-------|-----|---------------------------------|
| GRUBU | 12B | AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı) |
|-------|-----|---------------------------------|

550 g/l Fenbutatin oxide

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Rüzgara karşı uygulama yapmayınız.
- Uygulama bittikten sonra, elbiselerinizi çıkarınız, elinizi ve yüzünüzü yıkayınız.
- Tavsiye dozlarında kültür bitkilerinde zararlı etkisi yoktur.
- Boş ürün ambalajlarını hiçbir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road
Khar (W), Mumbai- 400 052, HİNDİSTAN

ÜRETİM TESİSİ

UPL LIMITED

Plot No 3101/02, G.I.D.C. Ankleswar
Gujarat, HİNDİSTAN – 393 002

RUHSAT SAHİB FİRMA

UPL AGROMED TARIM İLAÇLARI VE TOHUMCULUK SAN. VE TİC. A.Ş.
İncirlik Cumhuriyet Mah. İncirlik Bulvarı, No: 316/Z.01 Yüreğir/ADANA
Tel: 0 (322) 346 46 76 Faks: 0 (322) 346 47 41

UPL AGROMED
Tarım İlaçları ve Tohumculuk San. ve Tic. A.Ş.
İncirlik Cumhuriyet Mah. İncirlik Bulv. No 316/Z 01
Yüreğir / ADANA Yüreğir V.D. 893 0276 273
Tel 0322 346 46 76 - Faks: 0322 346 47 41
Mersis No: 0893027627300002

MEHMET BAŞER
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ

24 Ocak 2018

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

