

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj Numarası :
Ruhsat Tarihi ve Numarası :

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Kullanma Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	60 g/100 L su	14 gün
	Külleme (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	60 g/100 L su	
ARMUT	Karaleke (<i>Venturia pirina</i>)	60 g/100 L su	14 gün
ŞEFTALİ	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	60 g/100 L su	14 gün
KAYISI	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	60 g/100 L su	14 gün
KİRAZ VE VİŞNE	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Monilinia laxa</i>)	60 g/100 L su	14 gün
YENİ DÜNYA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i> var. <i>eriobotryae</i>)	60 g/100 L su	14 gün
AYVA	Monilya (<i>Sclerotinia linhartiana</i>)	60 g/100 L su	14 gün
HIYAR, KAVUN*	Kabakgillerde külleme (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>)	40 g/100 L su	3 gün
BAĞ**	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	100 g/100 L su	14 gün
ŞEKERPANCARI	Yaprak leke hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	40 g/100 L su	21 gün

*Ege ve Akdeniz Bölgesinde tavsiye edilmemelidir.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda değilse karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.



ANKİT

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU B1,1 FUNGİSİT (Mantar İlacı)

% 70 Thiophanate methyl

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Soluma: Aşırı miktarda solunduğunda burun ve solunum yollarını tahriş edebilir. Solunması halinde zararlıdır.

Yutma: Yutulması halinde zararlı olabilir. Kusma, mide bulantısı, mide ağrıları, koordinasyon kaybı.

Ciltle Temas: Alerjik reaksiyon.

Gözlerle Temas: Kızarıklık, tahriş, göz yaşına neden olur.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Genel Bilgiler: Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Soluma: Temiz havaya çıkartın. Nefes alamıyorsa, mümkünse ağızdan ağıza suni teneffüs uygulayın. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru arayın.

Yutma: Ağız suyla çalkalayın. Bilinci yerinde olmayan kişiye asla içmesi için bir şey vermeyin. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız bir ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru arayın.

Ciltle Temas: Derhal bol suyla 15-20 dakika yıkayarak çıkartın. Eğer belirtiler devam ederse, bir doktor çağırın.

Gözlerle Temas: Su ile 15-20 dakika boyunca dikkatli bir şekilde yıkayın. Eğer varsa ve çıkarması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurun.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ: Semptomlara göre tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR. 9 Kasım 2018

Net Miktarı :
Azami Perakende Satış Fiyatı :

İÇİNDEKİLER: Thiophanate methyl

ZARARLILIK İŞARETİ



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H341: Genetik hasara yol açma şüphesi var.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P260: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçindekileri / kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

UPL ZİRAAT
ve KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adalet Mah. Manas Bulv. No:47B/3107
Rayraklı/İZMİR Hasan Tahsin V.D. 706 025 4141
Tel: 0232 446 57 89-90 Faks: 0232 489 04 82
Mersis No: 0206000014100017

Cansu YARIMOĞLU
Ruhsatlandırma Uzmanı

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma karalekesi

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3–5 gün önce)
2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70–80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Elma küllemesi

1. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde
2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70 'i döküldüğünde
- 3 ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulamalara devam edilir.

Armut karalekesi

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3–5 gün önce)
2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde
3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70–80 dökülünce
4. ve diğer uygulamalar kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün ara ile uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Şeftali, Kayısı, Kiraz ve Vişne)

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Yeni dünya karalekesi

1. Uygulama : Sonbaharda çiçek tomurcuqları kabarmadan önce,
2. Uygulama : Çiçek tomurcuqları açılmadan önce,
3. Uygulama : Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,
4. ve diğer uygulamalar, 3'ncü uygulamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Uygulama programı gerekirse firma önerilerine göre değiştirilebilir. Uygulama sayısı ve tarihleri kaydedilir.

Ayva monilyası

Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1. Uygulama: Çiçeklerin %5'i açtığında
2. Uygulama: Çiçeklerin %50'si açtığında
3. Uygulama: tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90–100'ü açtığında) yapılmalıdır.



İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	B1,1	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	-------------------------

% 70 Thiophanate methyl

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Balıklara zehirlidir, akarsu kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Bitki koruma ürününü orijinal ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka amaç için kullanmayınız usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

ZHEJIANG CORECHEM CO., LTD.

No.1388, Biangai Road, Xietang Town, Shangyu District, Shaoxing City, Zhejiang Province, ÇİN

ÜRETİM TESİSİ

ZHEJIANG WELLDONE CHEMICAL CO., LTD.

Chaoshan, Yuhang, Hangzhou, ÇİN

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

UPL ZİRAAT VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adalet Mah. Manas Blv. No: 47 B/3107 Bayraklı, İZMİR

Tel: +90 232 446 57 89-90

Faks: +90 232 489 04 82

UPL ZİRAAT
ve KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Adalet Mah. Manas Bulv. No: 47 B/3107

Bayraklı/İZMİR Hasana Tahsin V.D. 208 026 4141

Tel: 0232 446 57 89-90 Faks: 0232 489 04 82

Mersis No: 0206020414100017

Cansu YARIMOĞLU
Ruhsatlandırma Uzmanı

09 Kasım 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.



Kabakgillerde külleme (Hıyar, Kavun)

İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak 10 gün ara ile uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C nin üstünde ve orantılı nemin de %50' nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Bağ küllemesi

- 1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde
- 2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde
- 3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
- 4.ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı

Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5 inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: ANKİT adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup B1,1** olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ANKİT'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup B1,1** harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

UPL ANKİT

İSLANABİLİR TOZ (WP)

GRUBU	B1,1	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	-------------------------

% 70 Thiophanate methyl

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

ÜRETİCİ FİRMA

ZHEJIANG CORECHEM CO., LTD.
No.1388, Biangai Road, Xietang Town, Shangyu
District, Shaoxing City, Zhejiang Province, ÇİN

ÜRETİM TESİSİ

ZHEJIANG WELLDONE CHEMICAL CO., LTD.
Chaoshan, Yuhang, Hangzhou, ÇİN

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

UPL ZİRAAT VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adalet Mah. Manas Blv. No: 47 B/3107 Bayraklı, İZMİR

Tel: +90 232 446 57 89-90

Faks: +90 232 489 04 82

UPL ZİRAAT
ve KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Adalet Mah. Manas Bulv. No:47B/3107
Bayraklı/İZMİR Hasan Tahsin V.D.2017/284141
Tel: 0232 446 57 89-90 Faks: 0232 489 04 82
Mersis No: 020602014100017

Cansu YARIMOĞLU
Ruhsatlandırma Uzmanı

09 Kasım 2018

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

