


İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarj Numarası :  
Ruhsat Tarihi ve Numarası : 15.06.2016/10685

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu Ve Dönemi
TURUNÇGİLLER	Adi eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> )	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	
	İmamkavuşu ( <i>Senecio vulgaris</i> )	
	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	
	Kıraç çayı ( <i>Bromus sterilis</i> )	
	Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> )	
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	
	Tüysüz hanımdöşeği ( <i>Euphorbia serpens</i> )	
	Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	
	Yonca ( <i>Medicago spp.</i> )	
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMİYEN ALANLAR (KARA, DEMİRYOLU KENARLARI, HAVAALANLARI, FABRİKA BAĞÇELERİ, TARLA KENARLARI vs)	Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	
	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	
	Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )	250 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.
	Ufak sütleğen ( <i>Euphorbia exigua</i> )	
	Ballıbaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> )	
	Taş yoncası ( <i>Melilotus indica</i> )	
	Yumuşak itir ( <i>Geranium mole</i> )	
	Boynuz otu ( <i>Cerastium dichotomum</i> )	
	Kır üçgülü ( <i>Trifolium campestre</i> )	
Dikenli eşek marulu ( <i>Sonchus asper</i> )		
Püsküllü çayır ( <i>Bromus tectorum</i> )		
İki dallı hindiba ( <i>Crepis bifida</i> )		
Tilki kuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )		
Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )	500 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.	
Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		
Köpek dişi ayrığı ( <i>Cynodon dactylon</i> )		
Dikenli adaçayı ( <i>Salvia spinosa</i> )		
Topalak ( <i>Cyperus rotundus</i> )		
Daryapraklı sinirotu ( <i>Plantago lanceolata</i> )		
Aslan dişi ( <i>Taraxacum serotinum</i> )		



# FASCINATE®

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU H HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

280 g/l Glufosinate ammonium

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ. SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Boş bitki koruma ürünü ambalajının içerisine (¼) bir bölü dördüne kadar temiz su koyup iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankının içerisine boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrar ediniz.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

**Soluma:** Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı. Kardiyak aritmi, tansiyon, uyku hali, solunum depresyonu. **Yutma:** Bulantı, kusma. Gastrointestinal rahatsızlıklar. Titreme. Konvülsiyon.

**Ciltle temas:** Tahriş, kızarıklık. **Gözle temas:** Tahriş, kızarıklık.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Genel Bilgiler:** Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun. Etkiler gecikebilir; kazazedeyi 48 saat gözlem altında tutun.

**Soluma:** Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Solunum zorluğu çekildiğinde, oksijen verilmesi gerekebilir. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Yutma:** Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Ciltle Temas:** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol suyla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

**Gözlerle Temas:** Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

Net Miktarı :  
Azami Perakende Satış Fiyatı :

**İÇİNDEKİLER:** Glufosinate ammonium

#### ZARARLILIK İŞARETİ



#### UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ

**H302:** Yutulması halinde zararlıdır.

**H312:** Cilt ile teması halinde zararlıdır.

**H332:** Solunması halinde zararlıdır.

**H360Fd:** Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

**H373:** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P102:** Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

**P260:** Buharını/spreyini solumayın.

**P280:** Koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın.

**P501:** İçindekileri/kabı onaylanmış bir atık depolama alanında bertaraf edin.

**EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**UPL ZİRAAT ve KİMYA**  
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Adalet Mah. Manas Biv. No: 47B/3107 Bayraklı-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 206 026 4141  
Tel: 0232 446 57 89-90 Faks: 481 07 82  
Mersis No: 0206026414000000

**Mehmet BAŞER**

Ruhsatlandırma ve  
Yeni Ürün Geliştirme Müdürü


10 Temmuz 2020  
TARIM VE ORMAN BAKANI İGİ  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

**Dr. Yunus BAYRAM**  
Müdür Yardımcısı  
1923

39 H

**KULLANILACAKI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR**

Bitki Adı	Yabancı Ot Adı	Kullanma Dozu Ve Dönemi
ELMA	Tarla sarmaşığı ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	500 ml/da Çıkış sonrası uygulanır
	Horoz ibiği ( <i>Amaranthus albus</i> )	250 ml/da Çıkış sonrası uygulanır
ZEYTİN	Taş yoncası ( <i>Melilotus indica</i> )	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.
	Yabani havuç ( <i>Daucus corata</i> )	
	Dönbaba ( <i>Erodium cicutarium</i> )	
	İmamkavuşu ( <i>Senecio vulgaris</i> )	
	Adi eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> )	
NAR	Düğmeli yonca ( <i>Medicago orbicularis</i> )	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.
	Dönbaba ( <i>Erodium cicutarium</i> )	
	Tüysüz hindiba ( <i>Crepis capillaris</i> )	
	Köpeküzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )	
	Fare kulağı ( <i>Anagallis caerulea</i> )	
	Yer fesleğeni ( <i>Mercurialis annua</i> )	
ŞEFTALİ	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> )	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.
	Köpeküzümü ( <i>Solanum nigrum</i> )	
	Pire otu ( <i>Conyza canadensis</i> )	
	Adi eşek marulu ( <i>Sonchus oleraceus</i> )	
FINDIK	Yıldızlı üçgül ( <i>Trifolium stellatum</i> )	200 ml/da Çıkış sonrası uygulanır.
	İki dallı hindiba ( <i>Crepis bifida</i> )	
	Ballıbaba ( <i>Lamium purpureum</i> )	
	Dönbaba ( <i>Erodium cicutarium</i> )	
	İtalyan çimi ( <i>Lolium multiflorum</i> )	
	Rüzgar otu ( <i>Apera spica-veni</i> )	
	Tilki kuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )	
	Yabani havuç ( <i>Daucus corata</i> )	
	Yabani orman nanesi ( <i>Mentha spicata</i> )	
	Güneş sütlegeşi ( <i>Euphorbia helioscopia</i> )	
	Yeşil kirpidarı ( <i>Setaria viridis</i> )	
	Düğmeli yonca ( <i>Medicago orbicularis</i> )	
	Isırganotu ( <i>Urtica urens</i> )	



**FASCINATE®**

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU H HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

280 g/l Glufosinate ammonium

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

**KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- Dört saat içinde yağmur bekleniyorsa uygulama yapmayınız.
- Kurumuş, ıslak, donmuş veya hastalıklı yabancı otlara uygulama yapmayınız.
- Kurak ve sıcak şartlarda (33°C sıcaklıkla birlikte % 50'nin altında bağıl nem) uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürününün etkisi 2-4 günde ortaya çıkar. Ancak, serin şartlarda tam kuruma 20-30 günde oluşabilir.
- Boş ürün ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapılmamalıdır. Bitki koruma ürününün hazırlanmasında ve depolanmasında çinko ve galvanizli metal kaplar kullanılmamalıdır.
- Bitki koruma ürününün karıştırılmasında mutlaka temiz su kullanılmalıdır.
- Total bir herbisit olduğundan tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir. İki yaşından küçük fidanlar/asmalar etrafında kullanılabilir, ancak bitkilerin yeşil kabuk kısımlarına ve yapraklarına bitki koruma ürünü ulaşmamalıdır.
- Hiçbir sulama sistemiyle bu ürünü kullanmayınız.
- Bir üretim sezonunda, dekara 500 g'dan fazla aktif madde kullanmayınız, 3 uygulamadan fazla yapmayınız.
- Uygulamalar arasında en az 14 gün olmalıdır.
- Uygulama yapılmış meyve bahçesi ürünlerini hayvanlara yedirmeyiniz.

**DEPOLAMA DURUMU:** Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ FİRMA**

**UPL LIMITED**

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road  
Khar (W), Mumbai- 400 052, HİNDİSTAN

**ÜRETİM TESİSİ**

**UPL LIMITED**

Plot No 3101/02, G.I.D.C. Ankleswar  
Gujarat, HİNDİSTAN – 393 002

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA**

**UPL ZİRAAT VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Adalet Mah. Manas Blv. No: 47 B/3107, Bayraklı, İZMİR

Tel: +90 232 446 57 89-90

Faks: +90 232 489 04 82

**UPL ZİRAAT ve KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**  
Adalet Mah. Manas Blv. No: 47B/3107 Bayraklı-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 206 026 4141  
Tel: 0232 446 57 89-90 Faks: 489 04 82  
Mersis No: 02060264

**Mehmet BAŞER**  
Ruhsatlandırma ve  
Yeni Ürün Geliştirme Müdürü

10 Temmuz 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

39 N

**Dr. Yunus BAYRAM**  
Genel Müdür Yardımcısı V.



#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.


#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:** Uygulamadan en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna bitki koruma ürünü temas etmemelidir. Ürünün etki şekli sistemik olduğundan, en iyi sonucu alabilmek için uygulamanın 5 gün öncesinden 7 gün sonrasına kadarki süreçte yabancı otları zedeleyecek toprak işleme yapılmamalıdır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:** FASCINATE® adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup H olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için FASCINATE®'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup H harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyor ise ön karışım testi yapılmalıdır.



# FASCINATE®

SUDA ÇÖZÜNEN KONSANTRE (SL)

GRUBU	H	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	---	-----------------------------

280 g/l Glufosinate ammonium

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

#### ÜRETİCİ FİRMA

UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road  
Khar (W), Mumbai- 400 052, HİNDİSTAN

#### ÜRETİM TESİSİ

UPL LIMITED

Plot No 3101/02, G.I.D.C. Ankleswar  
Gujarat, HİNDİSTAN – 393 002

#### RUHSAT SAHİBİ FİRMA

UPL ZİRAAT VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adalet Mah. Manas Blv. No: 47 B/3107, Bayraklı, İZMİR

Tel: +90 232 446 57 89-90

Faks: +90 232 489 04 82

**UPL ZİRAAT ve KİMYA**  
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.  
Adalet Mah. Manas Blv. No: 47B/3107 Bayraklı-İZMİR  
Hasan Tahsin V.D. 206 026 4141  
Tel: 0232 446 57 89-90 Faks: 489 04 82  
Mersis No: 020602641100007

**Mehmet BAŞER**

Ruhsatlandırma ve  
Yeni Ürün Geliştirme Müdürü

10 Temmuz 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

*Dr. Yunus BAYRAM*  
Genel Müdür Yardımcısı V.



BSG H